

Протокол
 от 04.04.2022 г.
 по запросу ценовых предложений

г. Алматы
 ул. Айтеке би 116

«01» апреля 2022 г.
 12 часов 00 минут

1. Наименование и адрес Заказчика: Г.КП на ПХВ «Городской ревматологический центр» ул. г. Алматы, адрес: г. Алматы, ул. Айтеке би 116.
2. Краткое описание и цена закупляемых товаров, торговое наименование:

№ лота	Международное непатентованное название препарата	Торговое название	Тех. характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
для Полуавтоматический анализатор гемостаза BFT II							
1	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ)	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ) 10 * 4 мл (400 опр/ед)	Реагент, человеческий тромбопластин для определения (ПВ) (ПТТ) МНО, фибриногена и активности факторов свертывания II, V, VII и X по методу Квика. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (< 15 мг/л) Фасовка: не менее 10 x 5 мл.	набор	30	49 750,00	1 492 500,00
2	PT Multi calibrator (6 levels) Необходим для определения Протромбинового времени (1 набор в год)	PT Multi calibrator (6 levels) Необходим для определения Протромбинового времени (1 набор в год) 6 уровней	Мультикалибратор ПВ содержит 6 калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Стабильность после разведения (закрытый сосуд) при 2 до 8 °C 8 ч, 15 до 25 °C 4 ч, ≤ -18 °C 4 нед.	набор	1	83 830,00	83 830,00
3	LA 1 screening reagent 10 x for 2 ml 200 (Реагент для скрининга LA 10 x на 2 мл 200)	LA 1 screening reagent 10 x for 2 ml 200 (Реагент для скрининга LA 10 x на 2 мл 200) 10 X 2.0 ML (200 опр.)	Упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для обнаружения врожденных антикоагулянтов. Состав: LA 1 и реагент для подтверждения LA 2 содержат яд гадюки Рассела, фосфолипиды, активаторные агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. Срок хранения 2 до 8 °C. Следующие восстанавливаемые реагенты можно хранить в течение 8 ч при 37 °C, 24 ч при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при -20 °C. Фасовка 10 x 2 мл LA 1	набор	10	155 350,00	1 553 500,00

[Подпись]

[Подпись]


[Подпись]

[Подпись]


4	LA 2 confirmation reagent 10 x for 1 ml 1000 Реагент подтверждающий для LA 2 10 x на 1 мл 1000	LA 2 confirmation reagent 10 x for 1 ml 1000 Реагент подтверждающий для LA 2 10 x на 1 мл 1000 10 x 1 ml	Упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для обнаружения врожденных антикоагулянтных Состав: LA 1 и реагент для подтверждения LA 2 содержат яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антистабилизаторные агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, антиоксиданты и красители. Срок хранения 2 до 8 °C. Следующие восстановительные реагенты можно хранить в течение 8 ч при 37 °C, 24 ч при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при -20 °C. Фасовка 10 x 1 мл LA 2	набор	10	155 350,00	1 553 500,00
5	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинного времени АСТП	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинного времени АСТП 10x2 ml/400 (определенный)	Жидкий кроличий мозговой кефалин с активатором плазмы, используемый для определения (АЧТВ) и также позволяет установить наличие серьезного функционального дефицита факторов II, V, X или фибриногена. Фасовка: 10 x 2 мл Состав: кефалин (экстракт из дефибрированного мозга кролика) в 1,0 x 10-4 М эллаговой кислоты, буферный, стабилизированный и консервированный. Эталоных значений активности кефалина из мозга кролика нет.	набор	30	42 130,00	1 263 900,00
6	Хлорид кальция 0.025 моль/л Необходим для определения АЧТВ (Асип)	Хлорид кальция 0.025 моль/л Необходим для определения АЧТВ (Асип) 10x15 мл (1500 опр)	Раствор хлорида кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов свертываемости крови. 10 x 15 мл CaCl2 SOLUTION, раствор хлорида кальция Состав: Раствор CaCl2 0.025 моль/л.	набор	8	25 258,00	202 064,00
7	Реагент для определения фибриногена Multi fibrin U	Реагент для определения фибриногена Multi fibrin U (500 опр) 10 x5 ml	Количественное определение фибриногена в плазме: А Приобретенной и В Врожденной гипифибриногемии или афибриногемии модификация метода по Клаусе Состав: телячий свероточный тропонин (50 ME/мл), пептид, тормозящий агрегацию фибрина (гли-про-арг-прола-амид, 0.15 г/л), кальций хлорид (1.5 г/л), гексаметрин бромид, полистиленгликоль 6000, натрий хлорид, трис, бычий альбумин, Консервант: азид натрия (< 1 г/л).	набор	24	83 830,00	2 011 920,00
8	Стандарт для Фибриногена уровень 1-6 (1-2 набора в год) по мере необходимости	Стандарт для Фибриногена уровень 1-6 (1-2 набора в год) по мере необходимости (6 x1 ml)	Калибраторы фибриногена 1-6 используются для построения стандартных кривых, предназначенных для анализа фибриногена методом Клауса! Состав: Набор калибраторов фибриногена, REF: OQVK 011, включающий следующее: 6 x 1 мл калибраторы фибриногена CALIBRATOR 1 - CALIBRATOR 6, уровни 1-6	набор	1	64 150,00	64 150,00
9	Реагент для определения Test Thrombin набор	Реагент для определения Test Thrombin набор 500 опр	Сублимированный реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Реагент содержит бычий тромбин и бычий альбумин. Стабильность реагента после вскрытия не менее 7 дней при температуре при 2 до 8 °C. Фасовка не менее 10x5 мл.	набор	24	83 830,00	2 011 920,00
10	Диспосистема	Диспосистема 500 шт	Одноразовые пластиковые реакционные коветы, предназначенные для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Состав упаковки: ковета с якорем металла, 100 шт в пакете Вес (нетто): 0.83 кг. Объем (нетто): 0.008228 куб. м. Транспортировка при +15°C +25°C Условия хранения: +15+25°C. В упаковке 500 шт.	упак	61	100 426,00	6 125 986,00

Handwritten signature and initials:
 [Signature] 8-005 [Initials] [Initials]

11	Control Plasma N 10 x1 мл	Control Plasma N 10 x1 мл (100 мкл на 1 опр)	Реагент используемый для оценки точности и аналитического отклонения следующих анализаторов в нормальном диапазоне: (11B), (A41B), (1B), Фибриноген, Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и (ФВ), Плазминоген. Внутренние антикоагулянты. Реагент получают из пурированной плазмы отобранных здоровых доноров крови. Реагент стабилизируют НЕРЕС-буфером (12 г/л) и подвергают лиофилизации. Во избежание контактной активации системы свертывания препарат поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: при температуре от 15 до 25 °С 4 ч, при температуре ≤ -20 °С 4 нед флаконка 10 x 1,0 мл	набор	7	83 830,00	586 810,00
12	Control Plasma P 10 x 1 мл	Control Plasma P 10 x 1 мл (100 мкл на 1 опр)	Реагент используемый для оценки точности и аналитического отклонения следующих анализаторов в нормальном диапазоне: (11B), (A41B), (1B), Фибриноген, Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и (ФВ), Плазминоген. Внутренние антикоагулянты. Реагент получают из пурированной плазмы отобранных здоровых доноров крови. «Контрольная плазма. Норма» стабилизируют НЕРЕС-буфером (12 г/л) и подвергают лиофилизации. Стабильность после восстановления: при температуре от 15 до 25 °С 4 ч, при температуре ≤ -20 °С 4 нед флаконка 10 x 1,0 мл	набор	7	102 130,00	714 910,00
для автоматического биохимического анализатора (BS-200E)							
13	С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40 +1*10 (120 опр)	С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40 +1*10 (120 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Высокочувствительный С-реактивный белок R1: 1x40 мл + R2: 1x10 мл Двухкомпонентный набор реагентов для определения СРР методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	35	60 000,00	2 100 000,00


14	RF (Ревматоидный Фактор) (C and O) 1×40+1×15 (incl. Cal. 5-0.5 + control 1×3) (150 опр)	RF (Ревматоидный Фактор) (C and O) 1×40+1×15 (incl. Cal. 5-0.5 + control 1×3) (150 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора «Eco» Ревматоидный фактор с калibratorом R1 1×40 мл + R2 1×15 мл + Calibrator 5×0.5 мл. Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переноса в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультиэкспрессор. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	35	155 000,00	5 425 000,00
15	ASO (Антистрептолизин O) (C and O) 1×40+1×40 (incl. Cal. 1×0.5 + control 1×3) (120 опр)	ASO (Антистрептолизин O) (C and O) 1×40+1×40 (incl. Cal. 1×0.5 + control 1×3) (120 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения Антистрептолизина-O с калibratorом. Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1-40мл и R2-40мл для предотвращения контаминации и не требуется переноса в дополнительные картриджи, калibrator 1 фла. не менее 0.5 мл. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	18	225 000,00	4 050 000,00
16	СРБ латекс	СРБ латекс	Набор для определения С реактивного белка. Состав реагентов 1) СРБ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых антигенами к СРБ в бифере, азид натрия 0,95 г/л, (1×2,5мл) 2) Разбавитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1×5 мл) 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с СРБ > 15 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1×0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием СРБ < 1 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1×0,5 мл) 5) Тест-пластинки (3 шт) Количество исследований не менее 125 опр. Чувствительность теста 6 мг/л (5-10 мг/л). Диагностическая специфичность – не менее 96%	набор	200	30 200,00	6 040 000,00
17	РФ латекс	РФ латекс	Состав реагентов: 1) РФ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином в бифере, азид натрия 0,95 г/л, (1×2,5мл, 2) Разбавитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1×5 мл) 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с РФ ~ 25 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1×0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием РФ < 5 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1×0,5 мл) 5) Тест-пластинки (3 шт, 5 шт) Количество исследований не менее 250 опр. Чувствительность теста 8 (6-16) МЕ/мл. Диагностическая специфичность не менее 98,8%	набор	200	21 000,00	4 200 000,00

Handwritten signature and initials:

 Zaitsev
 Ant-
 8-
 8

18	АСЛО датекс	АСЛО датекс	Состав наборов I)ASLO-Dатекс: суспензия полипропиленовых датексных частиц, покрытых стрептолизином D в буфере, аэид натрия 0,95 г/л, (1 × 2,5 мл, 2 × 2,5 мл) 2) Растворитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1 × 5 мл) 3) Положительный контроль: сыrovотка крови человека с АСЛ (O) > 200 МЕ/мл, аэид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыrovотка крови с содержанием АСЛ (O) < 100 МЕ/мл, аэид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 5) Тест-пластинки (3 шт, 5 шт) Количество исследований: не менее 250 опр. Чувствительность теста 200±50 МЕ/мл. Диагностическая специфичность – не менее 97%	набор	80	35 000,00	2 800 000,00
19	Калибратор на специфичные белки (С3, С4, СРР, IgA, IgG, IgM, С реактивный белок) 5*1	Калибратор на специфичные белки (С3, С4, СРР, IgA, IgG, IgM, С реактивный белок) 5*1	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Калибратор специф. белков: 5 × 1 мл (С3, С4, СРР, IgA, IgG, IgM, С реактивный белок). Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	10	201 200,00	2 012 000,00
20	Общий белок (Бюретовый метод) 4*40 (650, опр)	Общий белок (Бюретовый метод) 4*40 (650, опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Олигокомпонентный набор реагентов для определения ТР Общий белок R 4x40 мл. Объем рабочего раствора не менее 160 мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реакционной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	7	24 000,00	168 000,00
21	Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 опр	Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 опр	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT R1: 4x35 мл + R2: 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176 мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	25	30 000,00	750 000,00
22	Прямой билирубин Bil-D (метод VOX) 4*35 +2*18	Прямой билирубин Bil-D (метод VOX) 4*35 +2*18	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения Bil-D R1: 4x35 мл + R2: 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176 мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих кодом.	набор	8	38 000,00	304 000,00

Handwritten signatures and initials:


Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten initials: [Initials]

23	Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 4*35 +2*18	Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 4*35 +2*18	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBil/VOX 4x35 мл + R2. 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	28	37 800,00	1 058 400,00
24	Аспаратаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 опр	Аспаратаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 опр	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST R1: 4x35 мл + R2. 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	25	28 000,00	700 000,00
25	Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4*35 +2*18 (500 опр)	Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4*35 +2*18 (500 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP R1: 4x35 мл + R2. 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	6	30 700,00	184 200,00
26	Гамма-глутамилтрансфераза (ГТТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) (4*35 +2*18) 600 опр.	Гамма-глутамилтрансфераза (ГТТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) (4*35 +2*18) 600 опр.	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. 4x35 мл + R2. 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	3	38 800,00	116 400,00
27	Альфа-Амилаза (AMY) (Кинетический, УФ метод) (1*38 +1*10) 130 опр.	Альфа-Амилаза (AMY) (Кинетический, УФ метод) (1*38 +1*10) 130 опр.	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	6	36 400,00	218 400,00



28	Общий холестерин (TC) (конечная точка, холестеролаксида-пероксидаз) 4*40 (450 опр)	Общий холестерин (TC) (конечная точка, холестеролаксида-пероксидаз) 4*40 (450 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. R1 4x35 мл + R2 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 1600мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроль качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	16	31 900,00	510 400,00
29	Глюкоза Glt-GodPар (Глюкозоксидазный метод) (4*40 +2*20) 500 опр	Глюкоза Glt-GodPар (Глюкозоксидазный метод) (4*40 +2*20) 500 опр	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения Glt-GodPар. 4x40 мл + R2 2x20 мл. Объем рабочего раствора не менее 2000мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	25	21 500,00	537 500,00
30	Мочевина (UREA) 4*35 +2*18 (360)	Мочевина (UREA) 4*35 +2*18 (360)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	25	21 600,00	540 000,00
31	Креатинин CRE-A-J (Модифицированный метод Яффе) (3*35 +3*35) 450	Креатинин CRE-A-J (Модифицированный метод Яффе) (3*35 +3*35) 450	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRE-A-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	30	32 300,00	969 000,00
32	Мочевая кислота (UA) (Уриказано- пероксидазный метод) 4*40 +2*20 (500)	Мочевая кислота (UA) (Уриказано- пероксидазный метод) 4*40 +2*20 (500)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Ltd.Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	20	32 650,00	653 000,00


10.05.2024
С.С.С.
С.С.С.

33	Крепикниная (Кинетический, УФ Метод) 2*40 + 1*20 (300)	Крепикниная (Кинетический, УФ Метод) 2*40 + 1*20 (300)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора В/двухкомпонентный набор реагентов для определения С К. Объем рабочего раствора не менее 88мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	10	56 100,00	561 000,00
34	Лактатдегидрогеназа (LDH) (Кинетический, УФ Метод) (IFCC) 4*35 + 2*18 (450)	Лактатдегидрогеназа (LDH) (Кинетический, УФ Метод) (IFCC) 4*35 + 2*18 (450)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора/двухкомпонентный набор реагентов для определения. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	9	91 000,00	819 000,00
35	Кальций (Са) (Колориметрический метод (Арсенazo III)) (4*40) 450 опр	Кальций (Са) (Колориметрический метод (Арсенazo III)) (4*40) 450 опр	Реагенты для автоматического биохимического анализатора/двухкомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	8	17 400,00	139 200,00
36	Калий	Калий	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения LDH. Объем рабочего раствора не менее 100мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	85	72 000,00	6 120 000,00

Handwritten signature and date:
 12.05.2017
 12-5

41	Железо с калибратором и контролем R1: 2x40 мл+R2: 1x16 мл + Calibrator 1x1.5 мл+Control =1x5 мл	Железо с калибратором и контролем R1: 2x40 мл+R2: 1x16 мл + Calibrator 1x1.5 мл+Control =1x5 мл	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения Fe. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	2	52 000,00	104 000,00
42	Холестерин ННП	Холестерин ННП	Реагенты для автоматического биохимического анализатора, двухкомпонентный набор реагентов для определения Холестерина низкой плотности. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1-40мл и R2-14мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	2	84 000,00	168 000,00
43	Холестерин ННП	Холестерин ННП	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения Холестерина высокой плотности. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1-40мл и R2-14мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	2	79 700,00	159 400,00
44	Альбумин	Альбумин	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	3	19 400,00	58 200,00

Handwritten signature and initials:




45	Triple control ASO/C RP/Rf	Triple control ASO/C RP/Rf	Реагент для автоматического биохимического анализатора Тримиконтроль L 3x1 мл. Н 3x1 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd Китай) ASO/C RP/Rf. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd Китай, совместимым со считывателем	набор	18	315 700,00	5 682 600,00
46	Лампы для (BS-200E)	Лампы для (BS-200E)	Лампа галогеновая 12V, 20W, для автоматического биохимического анализатора.	шт	3	225 000,00	675 000,00
47	Игла для (BS-200E)	Игла для (BS-200E)	Зонд прободораборника для автоматического биохимического анализатора	шт	1	321 000,00	321 000,00
48	Дискогент 20 литров	Дискогент 20 литров	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Объем упаковки не менее 20 литров	шт	28	47 700,00	1 335 600,00
49	Лизирующий Р-Р 500 мл	Лизирующий Р-Р 500 мл	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должно содержаться цитины и алкалы. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместным со считывателем BS-30S, BS-3600. Объем флакона не менее 500мл.	шт	8	87 500,00	700 000,00
50	Моющий раствор 20 литров Rinse	Моющий раствор 20 литров Rinse	Специальный реагент марки M30 R, предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Объем упаковки не менее 20 литров.	шт	10	49 800,00	498 000,00
51	Чистящий раствор (17 мл)	Чистящий раствор (17 мл)	Универсальный чистящий реагент M30 P, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окислительного воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	шт	70	5 300,00	371 000,00

Olga T. Gerasimova

52	Контрольная кровь для гематологического анализатора BC 3000	Контрольная кровь для гематологического анализатора BC 3000	Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутривитракторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,0 мл каждый. Контрольные растворы предназначены для проверки контрольных данных не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к прецедентной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору BC-30S, BC-3600 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора	набор	13	117 000,00	1 521 000,00
55	Термобумага для гематологического анализатора	Термобумага для гематологического анализатора	Двухсторонняя термобумага для самоанализа 50ммх20м.	шт	70	450,00	31 500,00
56	Группа крови (целиколонный метод) анти-А	Группа крови (целиколонный метод) анти-А	Экспресс-диагностика (первичное определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показаниях трансфузии компонентов крови А.	набор	2	13 500,00	27 000,00
57	Группа крови (целиколонный метод) анти-В	Группа крови (целиколонный метод) анти-В	Экспресс-диагностика (первичное определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показаниях трансфузии компонентов крови В.	набор	2	13 500,00	27 000,00
58	Группа крови (целиколонный метод) анти-АВ	Группа крови (целиколонный метод) анти-АВ	Экспресс-диагностика (первичное определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показаниях трансфузии компонентов крови АВ.	набор	2	13 500,00	27 000,00
59	Группа крови (целиколонный метод) анти-Д супер	Группа крови (целиколонный метод) анти-Д супер	Экспресс-диагностика (первичное определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показаниях трансфузии компонентов крови D.	набор	2	13 500,00	27 000,00
60	Тест-полоски для общего анализа мочи	Тест-полоски для общего анализа мочи	Экспресс-анализатор мочи биохимический в комплекте с принадлежностями (Тест-полоски для полуколичественного метода: белок, глюкоза, лейкоциты, кровь и качественного метода: нитриты)	набор	50	28 900,00	1 445 000,00
61	Контроли для мочевого анализатора	Контроли для мочевого анализатора	Экспресс-анализатор мочи биохимический в комплекте с принадлежностями (контроль)	набор	14	190 000,00	2 660 000,00
62	LA1 (контроль LA1 высокий)	LA1 (контроль LA1 высокий)	LA1 (контроль LA1 высокий)	набор	3	131 500,00	394 500,00
63	LA2 (контроль LA2 низкий)	LA2 (контроль LA2 низкий)	LA2 (контроль LA2 низкий)	набор	3	131 500,00	394 500,00
	Итого						85 655 790,00

И. С. Сидоров

И. С. Сидоров

Предложения потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:

№ лота	Международное непатентованное название препарата	Торговое название	Теххарактеристика	Ед.изм.	Ко-во	Цена	Сумма	ОО "КАЗМЕДИНЖ ИНИРИНГ"	ОО "Центр Технической Компетисии ДЕМЕТ"	ИП "ТЕСО.К."
для Полуавтоматический анализатор гемостаза ВРТ II										
1	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ)	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ) 10 * 4 мл(400опред)	Реагент человеческий тромбопластин для определения (ПВ) (ПТИ) МНО, фибриногена и активности факторов свертывания II, V, VII и X по методу Канка. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л) Фасовка: не менее 10 x 5 мл.	набор	30	49 750,00	1 492 500,00	49 750,00	49 700,00	
2	PT Multi калибратор (6 levels) Необходим для определения Протромбинового времени (1 набор в год)	PT Multi калибратор (6 levels) Необходим для определения Протромбинового времени (1 набор в год) 6 уровней	Мультикалибратор ПВ содержит 6 калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Стабильность после разведения (закрытый сосуд) при 2 до 8 °C 8 ч, 15 до 25 °C 4 ч, ≤ -18 °C 4 нед.	набор	1	83 830,00	83 830,00	83 830,00	83 800,00	

Handwritten signature and initials:




3	LA 1 screening reagent 10 x for 2 ml 200 (Реагент для скрининга LA 10 x на 2 мл 200)	LA 1 screening reagent 10 x for 2 ml 200 (Реагент для скрининга LA 10 x на 2 мл 200) 10 X 2.0 ml (200 o/p)	Упрощенный тест с разбавленным ядом галочки Рассела (DRVUT) для обнаружения волчаночных антикоагулянтов Состав: LA 1 и реагент для подквержения LA 2 содержат яд галочки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. Срок хранения 2 до 8 °C. Следующие восстанавливаемые реагенты можно хранить в течение 8 ч, при 37 °C, 24 ч, при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при -20 °C. Фасовка: 10 x 2 мл LA 1	набор	10	155 350,00	1 553 500,00	155 350,00	155 300,00	
4	LA 2 confirmation reagent 10 x for 1 ml 100(Реагент подквержающий для LA 2 10 x на 1 мл 100)	LA 2 confirmation reagent 10 x for 1 ml 100(Реагент подквержающий для LA 2 10 x на 1 мл 100) 10 x 1 ml	Упрощенный тест с разбавленным ядом галочки Рассела (DRVUT) для обнаружения волчаночных антикоагулянтов Состав: LA 1 и реагент для подквержения LA 2 содержат яд галочки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. Срок хранения 2 до 8 °C. Следующие восстанавливаемые реагенты можно хранить в течение 8 ч, при 37 °C, 24 ч, при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при -20 °C. Фасовка: 10 x 1 мл LA 2	набор	10	155 350,00	1 553 500,00	155 350,00	155 300,00	
5	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинного времени АСТП	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинного времени АСТП 10x2 мл(400 определений)	Жидкий кроличий мозговой кефалин с активатором плазмы, используемый для определения (АЧТВ) и также позволяет установить наличие серьезного функционального дефицита факторов II, V, X или фибриногена Фасовка: 10 x 2 мл. Состав кефалин (экстракт из легцирированного мозга кролика) в 1,0 x 10 ⁻⁴ М эдловой кислоты, буферный, стабилизированный и законсервированный. Стандартных значений активности кефалина из мозга кролика нет.	набор	30	42 130,00	1 263 900,00	42 130,00	42 100,00	

Handwritten signature and text:
 10/09/2017
 1553 500,00
 42 130,00
 42 100,00

6	Х-орид кальция 0.025 моль/л. Необходимо для определения АЧТВ (Actin)	Х-орид кальция 0.025 моль/л. Необходимо для определения АЧТВ (Actin) 10x15 мл (1500 опр)	Р-решор х-орид кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов: сверяемость крови 10 x 15 мл CaCl2 SOLUTION, р-решор х-орид кальция Состав Р-решор CaCl2 0.025 моль/л	набор	8	25 258.00	202 064.00	25 258.00	25 200.00	
7	Реагент для определения фибриногена Multi fibrin U	Реагент для определения фибриногена Multi fibrin U (500 опр) 10 x5 ml	Количественное определение фибриногена в плазме: А. Прямой и В. Обратный титрофибриногенными или афибриногенными модификация метода по Клаусса. Состав: телулич сыпороочный, тромбин (50 ME/мл), пептид, тормозящий агрегацию фибрина (гли-про-арг-прола-амид, 0.15 г/л), кальций хлорид (1.5 г/л), гексаметирил бромид, полиэтиленгликоль, 6000, натрий хлорид, трис, бычий альбумин, Консервант азда натрия (< 1 г/л).	набор	24	83 830.00	2 011 920.00	83 830.00	83 800.00	
8	Стандарт для фибриногена уровень 1-6 (1-2 набора в год) по мере необходимости	Стандарт для фибриногена уровень 1-6 (1-2 набора в год) по мере необходимости (6 x1 ml)	Калибраторы фибриногена 1-6 используются для построения стандартных кривых, предназначенных для анализа фибриногена методом Клаусса. Состав: Набор калибраторов фибриногена, REF: OQUC 011, включающий следующее: 6 x 1 мл калибраторы фибриногена CALBRATOR 1 - CALBRATOR 6, уровни 1-6	набор	1	64 150.00	64 150.00	64 150.00	64 100.00	
9	Реагент для определения Test Thrombin набор	Реагент для определения Test Thrombin набор 500 опр	Сублимированный реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Реагент содержит бычий тромбин и бычий альбумин. Стабильность реагента после вскрытия не менее 7 дней при температуре при 2 до 8 °C. Фасовка не менее 10x5 мл.	набор	24	83 830.00	2 011 920.00	83 830.00	83 800.00	

Handwritten signature and text:
 25 258.00
 202 064.00
 25 258.00
 25 200.00

10	Диспосиschema	Диспосиschema 500 шт	Одноразовые пластиковые реакционные ковши предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Состав упаковки: ковш с якорем мешалки, 100 шт в пакете Бес (нетто) 0.83 кг. Объем (нетто) 0.008228 куб.м. Транспортировка при +15°C +25°C Условия хранения +15+25°C В упаковке 500 шт	упак	61	100 426,00	6 125 986,00	100 426,00	100 400,00	
11	Control Plasma N 10 x1 ml	Control Plasma N 10 x1 ml (100 меш на 1 опр)	Реагент используемый для оценки точности и аналитического отклонения следующих аналитов в нормальном диапазоне: (ПВ), (АЧТВ), (ТВ), Фибриноген, Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и (ФВ), Плазминоген, Волчаночные антитоксигены Реагент получают из пулпированной плазмы отобранных здоровых доноров крови. Реагент стабилизируют НЕРЕС-буфером (12 г/л) и подвергают лиофилизации. Во избежание контактной активации системы свертывания препарат поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления при температуре от 15 до 25 °C 4 ч, при температуре ≤ -20 °C 4 нед. Фасовка: 10 x 1,0 мл	набор	7	83 830,00	586 810,00	83 830,00	83 800,00	





12	Control Plasma P 10 x 1 мЛ	Control Plasma P 10 x 1 мЛ (100 мкл на 1 опр)	Реагент используется для оценки точности и аналитического отклонения следующих анализаторов в нормальном диапазоне: (IIB), (ACTB)(TB), Фибриноген, Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и (ФВ), Плазминоген. Возмочные антикоагулянт. Реагент получают из пулрованной плазмы отобранных здоровых доноров крови. «Контрольная плазма. Норма» стабилизируют НЕРЕС-буфером (12 г/л) и подвергают лиофилизации. Стабильность после восстановления: при температуре от 15 до 25 °С 4 ч, при температуре ≤ -20 °С 4 нед. Фасовка: 10 x 1,0 мл	набор	7	102 130,00	714 910,00	102 130,00	102 100,00	
13	С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40 +1*10 (120 опр)	С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40 +1*10 (120 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Высокочувствительный С-реактивный белок R1: 1x40 мл + R2: 1x10 мл. Двухкомпонентный набор реагентов для определения СРБ методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	35	60 000,00	2 100 000,00			59 000,00

Relax Sweet Mint

14	RF (Ревматоидный Фактор) (C and Q) 1-40-1-15 (incl Cal 5-0.5 + control 1-3) (150 опр)	RF (Ревматоидный Фактор) (C and Q) 1-40-1-15 (incl Cal 5-0.5 + control 1-3) (150 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения RF методом «С-кд» Ревматоидный фактор с калибратором R1 1x40 мл + R2. 1x15 мл + Калибратор 5x0.5 мл. Объем рабочего раствора не менее 55 мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью ватпированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным штрих- кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	35	155 000,00	5 425 000,00				154 000,00
15	ASO (Антистрептолизин O) (C and Q) 1-40+1-40 (incl Cal. 1-0.5 + control 1-3) (120 опр)	ASO (Антистрептолизин O) (C and Q) 1-40+1-40 (incl. Cal. 1-0.5 + control 1-3) (120 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения Антистрептолизина-O с калибратором. Объем рабочего раствора не менее 80 мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1-40 мл и R2-40 мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Калибратор 1 фл. не менее 0,5 мл. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих- кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	18	225 000,00	4 050 000,00				224 000,00

Delovoy S. Gerasimov A. V. 15.05.2024


16	СРb латекс	СРb латекс	Набор для определения С реактивного белка. Состав реагентов 1) СРb-латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых антигенами к СРb в буфере; азид натрия 0,95 г/л (1 × 2,5 мл) 2) Растворитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1 × 5 мл) 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с СРb > 15 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием СРb < 1 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 5) Тест-пластины (3 шт./Количество исследований: не менее 125 опр. Чувствительность теста 6 мг/л (5-10 мг/л). Диагностическая специфичность – не менее 96%	набор	200	30 200,00	6 040 000,00			30 000,00
17	РФ латекс	РФ латекс	Состав реагентов: 1) РФ-латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином в буфере; азид натрия 0,95 г/л, (1 × 2,5 мл, 2 × 2,5 мл) 2) Растворитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1 × 5 мл) 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с РФ ~ 25 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием РФ < 5 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 5) Тест-пластины (3 шт., 5 шт./Количество исследований: не менее 250 опр. Чувствительность теста 8 (6-16) МЕ/мл. Диагностическая специфичность не менее 98,8%	набор	200	21 000,00	4 200 000,00			20 700,00
18	АСЛО латекс	АСЛО латекс	Состав наборов: 1) АСЛО-латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стрептолизинном О в буфере; азид натрия 0,95 г/л, (1 × 2,5 мл, 2 × 2,5 мл) 2) Растворитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1 × 5 мл) 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с АСЛО (О) > 200 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием АСЛО (О) < 100 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1 × 0,5 мл) 5) Тест-пластины (3 шт., 5 шт./Количество исследований: не менее 250 опр. Чувствительность теста 200 ± 50 МЕ/мл. Диагностическая	набор	80	35 000,00	2 800 000,00			34 800,00

Иванов

Заведующий

Иванов

19	Калибратор на специфичные белки (СЗ С4 СРР, IgA, IgG, IgM, С реактивный белок) 5*1	Калибратор на специфичные белки (СЗ С4 СРР, IgA, IgG, IgM, С реактивный белок) 5*1	специфичность – не менее 97%						2100 5000,00
20	Общий белок (биуретовый метод) 4*40 (650,0пр)	Общий белок (биуретовый метод) 4*40 (650,0пр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Калибратор специф. белков, 5*1 мл (СЗ С4 СРР, IgA, IgG, IgM, С реактивный белок) Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	10	201 200,00	2 012 000,00		
21	Аминин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 опр	Аминин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 опр	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT R1, 4x35 мл + R2, 2x18 мл Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в однокорпусные оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	25	30 000,00	750 000,00		29 500,00


22	Прямой билюрбин Bil-Дискол VOX) 4*35 +2*18	Прямой билюрбин Bil-Дискол VOX) 4*35 +2*18	Реагенты для автоматического биохимического анализатора двухкомпонентный набор реактивов для определения Bil-D R1: 4x35 мл + R2: 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом.	набор	8	38 000,00	304 000,00				37 500,00
23	Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 4*35 +2*18	Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 4*35 +2*18	Реагенты для автоматического биохимического анализатора, двухкомпонентный набор реактивов для определения TBIL/VOX 4x35 мл + R2: 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	28	37 800,00	1 058 400,00				37 400,00
24	Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 отр	Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 отр	Реагенты для автоматического биохимического анализатора двухкомпонентный набор реактивов для определения GOT/AST R1: 4x35 мл + R2: 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	25	28 000,00	700 000,00				27 500,00


Handwritten signature and initials:
 *Handwritten initials*  *Handwritten initials* 

25	Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4*35 + 2*18 (500 опр)	Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4*35 + 2*18 (500 опр)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения АЛР. R1 4x35 мл + R2 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реалитиной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	6	30 700,00	184 200,00		30 000,00
26	Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 4*35 + 2*18) 600 опр.	Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 4*35 + 2*18) 600 опр.	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT 4x35 мл + R2 2x18 мл. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реалитиной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	3	38 800,00	116 400,00		38 000,00
27	Альфа-Ампилаза (АМУ) (Кинетический, УФ метод) (1*38 +1*10) 130 опр.	Альфа-Ампилаза (АМУ) (Кинетический, УФ метод) (1*38 +1*10) 130 опр.	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реалитиной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	6	36 400,00	218 400,00		36 000,00

Handwritten signature and text:
 2008.08.08
 2008.08.08
 2008.08.08

30	Мочевина (UREA) 4*35 +2*18 (360)	Мочевина (UREA) 4*35 +2*18 (360)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	25	21 600,00	540 000,00				21 300,00
31	Креатинин CREA-J (Модифицированный метод Яффе) (3*35 +3*35) 450	Креатинин CREA-J (Модифицированный метод Яффе) (3*35 +3*35) 450	Реагенты для автоматического биохимического анализатора двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	30	32 300,00	969 000,00				32 000,00
32	Мочевая кислота (UA) (уриказно-пероксидазный метод) 4*40 +2*20 (500)	Мочевая кислота (UA) (уриказно-пероксидазный метод) 4*40 +2*20 (500)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Ltd. Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	20	32 650,00	653 000,00				32 000,00

Handwritten signature and initials:





33	Креатининаза (Кинетический, УФ-Метод) 2*40 + 1*20 (300)	Креатининаза (Кинетический, УФ-Метод) 2*40 + 1*20 (300)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Вдвухкомпонентный набор реагентов для определения СК. Объем рабочего раствора не менее 88мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера K1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	10	56 100,00	561 000,00				55 400,00
34	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (Кинетический, УФ-Метод) (IFCC) 4*35 + 2*18 (450)	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (Кинетический, УФ-Метод) (IFCC) 4*35 + 2*18 (450)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Двухкомпонентный набор реагентов для определения. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера K1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и разрешения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	9	91 000,00	819 000,00				90 000,00

Olga S. S. S. S.

35	Калий (Ca) (Копиретрический метод (Арсеано III)) (4*40) 450 опр	Калий (Ca) (Копиретрический метод (Арсеано III)) (4*40) 450 опр	Реагенты для автоматического биохимического анализатора/двухкомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в однократный оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	8	17 400,00	139 200,00			17 000,00
36	Калий	Калий	Реагенты для автоматического биохимического анализатора двухкомпонентный набор реагентов для определения LDH. Объем рабочего раствора не менее 100мл. Реагенты должны быть расфасованы в однократные оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	85	72 000,00	6 120 000,00			71 600,00

В. Савицкий

В. Савицкий


В. Савицкий

37	Мультиконтроль Кэпи Чем уровень 1, 6x5 мл (N)	Мультиконтроль Кэпи Чем уровень 1, 6x5 мл (N)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора В. Лифофильно высущенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих нормальным, для контроля качества тестов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DB-DSA, DB-VOX, TB-DSA, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-S, GLU-HK, GLU-O, GGT, HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Me, P, TP, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , C3, C4, CRP, HS-CRP, Apo-AI, Apo-B, HDL-C, LDL-C, PA, CK-MB, ASO, TRF, FER, UIBC. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	18	190 000,00	3 420 000,00			189 000,00
38	Мультиконтроль Кэпи Чем уровень 1, 6x5 мл (P)	Мультиконтроль Кэпи Чем уровень 1, 6x5 мл (P)	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Лифофильно высущенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих патологическим, для кон-троля качества тестов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DB-DSA, DB-VOX, TB-DSA, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-S, GLU-HK, GLU-O, GGT, HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Me, P, TP, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , C3, C4, CRP, HS-CRP, Apo-AI, Apo-B, HDL-C, LDL-C, PA, CK-MB, ASO, TRF, FER, UIBC. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	18	190 000,00	3 420 000,00			189 000,00

Handwritten signature and text:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

39	Мульти калибратор 10 ⁻⁵	Мульти калибратор 10 ⁻⁵	Реагенты для автоматического биохимического анализатора/люо равневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Люофильно высущенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPар, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBL/VOX, DBL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении люофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроеным сканером анализатора, для автоматического считывания референсных значений тестов в память анализатора.	набор	6	190 000,00	1 140 000,00				189 000,00
40	Моющий раствор 1 литр "Detergent" CD80	Моющий раствор 1 литр "Detergent" CD80	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Дeterгент для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет химического анализатора производства компании Mindray. Представляет собой концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное, биоразлагаемое. Эффективно удаляет белки, липиды, ноны и другие остатки химических реакций с поверхности кювет. Должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроеным сканером анализатора.	набор	56	43 000,00	2 408 000,00				42 700,00



41	Жестко с калибратором и контролем R1 2x40 мл-R2 1x16 мл + Calibrator 1x1.5 мл+Control = 1x5 мл	Жестко с калибратором и контролем R1 2x40 мл-R2 1x16 мл + Calibrator 1x1.5 мл+Control = 1x5 мл	Реагенты для автоматического биохимического анализатора / двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в память анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	2	52 000,00	104 000,00				51 400,00
42	Холестерин НЛП	Холестерин НЛП	Реагенты для автоматического биохимического анализатора. Двухкомпонентный набор реагентов для определения Холестерина низкой плотности. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1-10мл и R2-14мл для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора. Контейнеры должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	2	84 000,00	168 000,00				83 700,00

В. Сидор *Иванов* *Иванов* *Иванов*

43	Холестерин НВН1	Холестерин НВН1	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Двухкомпонентный набор Холестерина высокой плотности Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40чл и R2-14чл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	2	79 700,00	1 59 400,00			79 000,00
44	Альбумин	Альбумин	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Однокомпонентный набор Реагентов для определения АЛБ. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	3	19 400,00	\$8 200,00			19 000,00
45	Triple control ASO/CRP/RF	Triple control ASO/CRP/RF	Реагенты для автоматического биохимического анализатора Триплеконтроль L, 3x1 мл. Н, 3x1 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Minday Bio-medical Electronics Co., Ltd Китай). ASO/CRP/RF. Закрытая система Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Minday Bio-medical Electronics Co Ltd, Китай, совместимым со	набор	18	315 700,00	5 682 600,00			315 000,00




adcast

Бусы

adcast

adcast

46	Лампы для (BS-200E)	Лампы для (BS-200E)	Считыватель Лампа галогеновая 12V 20W для автоматического биохимического анализатора	шт	3	225 000,00	675 000,00			224 000,00
47	Игла для (BS-200E)	Игла для (BS-200E)	Зонд прободный для автоматического биохимического анализатора	шт	1	321 000,00	321 000,00			320 000,00
48	Дискогел 20 литров	Дискогел 20 литров	Специальный разбавитель марки М30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Объем упаковки не менее 20 литров	шт	28	47 700,00	1 335 600,00			47 300,00
49	Лизингующий Р-Р 500 мл	Лизингующий Р-Р 500 мл	Специальный жидкий реагент марки М30 СЕЛ, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем ВС-30S, ВС-3600. Объем флакона не менее 500мл.	шт	8	87 500,00	700 000,00			87 000,00
50	Моющий раствор 20 литров Rinse	Моющий раствор 20 литров Rinse	Специальный реагент марки М30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Объем упаковок-ки не менее 20 литров.	шт	10	49 800,00	498 000,00			49 500,00
51	Чистящий раствор (17 мл)	Чистящий раствор (17 мл)	Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	шт	70	5 300,00	371 000,00			5 000,00

52	Контрольная кровь для гемат анализатора BC 3000	Контрольная кровь для гемат анализатора BC 3000	Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор состоит из трех флаконов, емкость не менее 3,0 мл каждый. Контрольные растворы представляют проверенные по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехмерной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору BC-30S, BC-3600 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора	набор	13	117 000,00	1 521 000,00					116 000,00
55	Термометра для геманализатора	Термометра для геманализатора	Диаграммная термалента для самописцев 50ммх20м.	шт	70	450,00	31 500,00					400,00
56	Группа крови (поликлоновый метод) анти-A	Группа крови (поликлоновый метод) анти-A	Экспресс-диагностика (первичное определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показаниях трансфузии компонентов крови А.	набор	2	13 500,00	27 000,00					13 000,00
57	Группа крови (поликлоновый метод) анти-B	Группа крови (поликлоновый метод) анти-B	Экспресс-диагностика (первичное определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показаниях трансфузии компонентов крови	набор	2	13 500,00	27 000,00					13 000,00
58	Группа крови (поликлоновый метод) анти-AB	Группа крови (поликлоновый метод) анти-AB	Экспресс-диагностика (первичное определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показаниях трансфузии компонентов крови АВ	набор	2	13 500,00	27 000,00					13 000,00

В. Савин *В. Савин* *В. Савин* *В. Савин*

59	Группа крови (подключенный метод) анти-Д-супер	Группа крови (подключенный метод) анти-Д-супер	Экспресс-диагностика (кратчайшее определение группы крови и Rh-фактора) для первичного определения группы крови и резус-фактора и при экстренных показателях трансфузии компонентов крови D	набор	2	13 500,00	27 000,00			13 000,00
60	Тест-полоски для общий анализ мочи	Тест-полоски для общий анализ мочи	Экспресс-анализатор мочи биохимический в комплекте с принадлежностями (Тест-полоски для количественного метода белок, глюкоза, лейкоциты, кровь и качественного метода нитриты)	набор	50	28 900,00	1 445 000,00			28 500,00
61	контроли для мочевого анализатора	контроли для мочевого анализатора	Экспресс-анализатор мочи биохимический в комплекте с принадлежностями (контроль)	набор	14	190 000,00	2 660 000,00			188 000,00
62	LA1 (контроль LA1 высокий)	LA1 (контроль LA1 высокий)	LA1 (контроль LA1 высокий)	набор	3	131 500,00	394 500,00	131 500,00	130 000,00	
63	LA2 (контроль LA2 низкий)	LA2 (контроль LA2 низкий)	LA2 (контроль LA2 низкий)	набор	3	131 500,00	394 500,00	131 500,00	130 000,00	
	Итого						85 655 790,00	18 453 990,00	18 437 600,00	66 649 000,00

3. Дата и время предоставления ценового предложения:

- ТОО "Центр Технической Компетенции ДЕМЕУ" 30.03.2022 г., в 15:40
- ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" 30.03.2022 г., в 16:00
- ИП "ЛЕГОК" 31.03.2022 г., в 10:45

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупки или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- 1) ТОО "Центр Технической Компетенции ДЕМЕУ" г. Алматы, ул. Джаркентская 8 (юты № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,62,63) сумма договора: 18 437 600,00 тенге
- 2) ИП "ЛЕГОК" г. Алматы, ул. Жандосова д.166 (юты № 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61) сумма договора: 66 649 000,00 тенге

5. Потенциальные поставщики, ценовые предложения которых не соответствуют требованиям техническим характеристикам товаров: - отсутствует

(Handwritten signatures and initials)

6. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с инициальными предложениями: _____
- отсутствует

7. Поставщики, указанные в пункте 4, в срок должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным 1-й частью 9-го пункта 102 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Состав комиссии:

Омарова К.С. (И.о. Заместитель директора по МЧ) – председатель комиссии _____
Мусаева Н.Н. (И.о. Заместитель по ОМР – заместитель председателя) _____
Рыскелдиева Ф.Ж. (Главная медсестра) – член комиссии _____
Бестуров А.И. (провизор) – член комиссии _____
Хамитова А.З. (бух по материалам) – член комиссии _____
Секретарь тендерной комиссии: Сатыбалдиева М.А. – государственных закупок _____

